

Tisztelt Állattartók, Kedves Gazdik!

Enying településen az utóbbi hetekben felütötte fejét az ún. parvovírus.

A parvovírus a kutyák egyik leveszélyesebb, fertőző betegsége. A súlyos gyomor-bélgyulladásal járó betegség legjellemzőbb tünete a láz, levertség, hasmenés, hányás, kiszáradás, jelentős súlycsökkenés, s sok esetben a hányás, hasmenés vérzéses szövődményekkel is járhat.

A parvovírussal fertőzött kutya a bélsárral nagy mennyiségben üríti a vírust, s az bármely ember, állat vagy tárgy által átvihető, amely a fertőzött állat ürülékével érintkezik.



A fertőző betegség leginkább az oltatlan és a kölyök kutyák körében terjed, lappangási ideje 1-4 nap.

Nagyon fontos, hogy a kutya mielőbb infúziót kapjon, hiszen jelentős mennyiségű folyadékot veszít, ami nem kerül pótlásra. Életmentő lehet a korai felismerés és az azonnali állatorvosi ellátás: e nélkül erősen romlanak a beteg kutya túlélési esélyei.

A kutyák parvovirusa védőoltással megakadályozható, ha a kölyökkutya a megfelelő korban megkapja a szükséges oltást.

A védőoltások akkor a leghatékonyabbak, ha rögzített időpontokban megismétlik őket. A kölyökkutyák oltási programja általában 6-8 hetes korban kezdődik, a parvovírus oltást hét-kilenc hetes korban adják be nekik.

Ha a kutya parvovírus fertőzés bármely tünetét észleli kölyökkutyáján, azonnal forduljon az állatorvoshoz.

Legfontosabb a megelőzés!

- Felnőtt kutyánk kapja meg rendszeresen az oltásait!
- Az oltatlan, vagy a nem teljes oltási sorozattal rendelkező kölyökkutya esetében:
 - ne vigyük ki az utcára!
 - figyeljünk, hogy ne férjen hozzá az utcán használt cipőinkhez, mert ezeken megtapadhat a vírus!
 - ha állatorvoshoz visszük a kicsit, a váróban tartsuk az ölünkben!
 - otthonunkban rendszeresen fertőtlenítsünk!

Amennyiben fenti tünetek valamelyikét észleli az állattartó forduljon állatorvosához. A parvovírus tünetei könnyen összekeverhetőek a mérgezés tüneteivel, azonban kezelésük korántsem azonos módon történik!